

IDADE	VACINA	DOSE
AO NASCER	BCG	única
	Hepatite B (recombinante)	única
2 MESES	Adsorvida Difteria, Tétano, pertussis, Hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) - (Penta)	1ª dose
	Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP)	1ª dose
	Pneumocócica 10-valente (Conjugada) - (Pneumo 10)	1ª dose
	Rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada) - (VRH)	1ª dose
3 MESES	Meningocócica C (conjugada) - (Meningo C)	1ª dose
4 MESES	Adsorvida Difteria, Tétano, pertussis, Hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) - (Penta)	2ª dose
	Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP)	2ª dose
	Pneumocócica 10-valente (Conjugada) - (Pneumo 10)	2ª dose
	Rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada) - (VRH)	2ª dose
5 MESES	Meningocócica C (conjugada) - (Meningo C)	2ª dose
6 MESES	Adsorvida Difteria, Tétano, pertussis, Hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) - (Penta)	3ª dose
	Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP)	3ª dose
	Vacina Covid-19	1ª dose
7 MESES	Vacina Covid-19	2ª dose
9 MESES	Febre amarela (atenuada) - (FA)	Uma dose
12 MESES	Pneumocócica 10-valente (Conjugada) - (Pneumo 10)	Reforço
	Meningocócica C (conjugada) - (Meningo C)	Reforço
	Sarampo, caxumba, rubéola (Tríplice viral)	1ª dose
15 MESES	Adsorvida Difteria, Tétano e pertussis (DTP)	1º reforço
	Poliomielite 1 e 3 (atenuada) - (VOPb)	1º reforço
	Adsorvida hepatite A (inativada)	1 dose
	Tetraviral	1 dose
4 ANOS	Adsorvida Difteria, Tétano e pertussis (DTP)	2º reforço
	Febre Amarela (atenuada)	Reforço
	Poliomielite 1 e 3 (atenuada) - (VOPb)	2º reforço
	Varicela (monovalente) - (Varicela)	1 dose
5 ANOS	Febre Amarela (atenuada) - (FA)	1 dose
	Pneumocócica 23-valente - (Pneumo 23)	2 doses
9 ANOS E 10 ANOS	HPV Papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (HPV4 - recombinante)	2ª doses